

## ABAGEL FORMICA

CEBO ALIMENTARIO EN GEL PARA UN CONTROL EFICAZ Y DISCRETO		
<b>COMPOSICIÓN</b> 0.01% IMIDACLOPRID	<b>Registro Oficial de Biocidas</b> ES/MR(NA)-2018-18-00476	<b>FORMULACIÓN</b> CEBO INSECTICIDA
		
<b>PLAGAS</b>	Hormiga faraón ( <i>Monomorium pharaonis</i> ) Hormiga argentina ( <i>Linepithema humile</i> )	
<b>MODO DE EMPLEO</b>	LISTO USO: APLICACIÓN EN PUNTOS DE CEBO	<b>PLAZO DE SEGURIDAD</b> NO PROCEDE
<b>EMBALAJE UD/CAJA</b>	1 ESTUCHE 6 UD x 35 g CAJA 13 ESTUCHES	
<b>PARA USO EXCLUSIVO PERSONAL AUTORIZADO</b>		

<b>MODO DE ACCIÓN</b>
<p>El ingrediente activo Imidacloprid actúa uniéndose a las neuronas de los insectos. Esta unión provoca una perturbación en la transmisión de los impulsos nerviosos lo que es letal para las hormigas.</p> <p>Las hormigas fuertemente atraídas por el gel-cebo, entran en contacto con el producto, lo ingieren y se impregnan con él, trasladándolo al nido, contaminando al resto de la colonia tanto por contacto como por ingestión independientemente de su estado de desarrollo (desde huevos hasta hormigas adultas, incluyendo a la reina).</p>

DOSIFICACIÓN								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dosis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Uso interior</i></td> <td style="text-align: center;">1 -2 gota/ m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><i>Uso exterior</i></td> <td style="text-align: center;">nidos: 1 gota en la entrada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">perímetros: 1 gota por metro lineal</td> </tr> </tbody> </table>	Dosis		<i>Uso interior</i>	1 -2 gota/ m <sup>2</sup>	<i>Uso exterior</i>	nidos: 1 gota en la entrada	perímetros: 1 gota por metro lineal
Dosis								
<i>Uso interior</i>	1 -2 gota/ m <sup>2</sup>							
<i>Uso exterior</i>	nidos: 1 gota en la entrada							
	perímetros: 1 gota por metro lineal							
<p>Nota: 1 gota de gel es 0.2 g. Las aplicaciones se pueden repetir continuamente cada 2-3 meses o cuando se haya consumido el producto (máximos 12 aplicaciones/año).</p>								
APLICACIÓN								
<p><b>ABAGEL FORMICA</b> es adecuado para el tratamiento de control de plagas en lugares como casas, apartamentos, bodegas, edificios públicos, centros comunitarios, cines, Iglesias, locales comerciales, hoteles, restaurantes, escuelas, guarderías, hospitales, residencias de ancianos, centros de atención, baños públicos, medios de transporte (barcos, trenes, aviones), zonas de almacenamiento, naves industriales...</p> <p>Antes del tratamiento eliminar cualquier fuente de alimento que pueda interferir con la ingestión del gel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando las hormigas se encuentren en interiores, aplicar <b>ABAGEL FORMICA</b> en gotas o en finas líneas cerca de las rutas de las hormigas, puntos de entrada y nidos.</li> <li>• Cuando las hormigas se encuentren en exteriores, aplicar <b>ABAGEL FORMICA</b> en gotas o en finas líneas cerca de las rutas de las hormigas o nidos. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La aplicación de exterior solo debe realizarse en suelo pavimentado (no aplicar en suelo sin pavimentar).</li> </ul> </li> <li>• Compruebe el consumo de <b>ABAGEL FORMICA</b> una vez a la semana.</li> </ul> <p>Durante las inspecciones, compruebe la zona tratada y si es necesario, sustituya el gel. No aplicar <b>ABAGEL FORMICA</b> sobre superficies absorbentes.  Aplique <b>ABAGEL FORMICA</b> lejos de la luz solar directa o fuentes de calor (por ejemplo, no lo coloque bajo un radiador).  Evite el uso continuado del producto.  Informe a su distribuidor si el tratamiento no es efectivo.</p>								