

MASSOBLOCK® 25

CEBO RODENTICIDA EN FORMA DE BLOQUE		
COMPOSICIÓN 0.025% BRODIFACOUM 0.001% SUSTANCIA AMARGANTE	Registro Oficial de Biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00551	FORMULACIÓN CEBO EXTRUSIONADO
		
PLAGAS	RATAS Y RATONES.	
MODO DE EMPLEO	LISTO USO. APLICACIÓN EN PORTACEBOS DE SEGURIDAD.	
PRESENTACIÓN	BLOQUE 20 g	CUBO 8 kg
USO PERSONAL PROFESIONAL y PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO		

MODO DE ACCIÓN

MASSOBLOCK 25 es un cebo rodenticida listo para su uso en bloque de parafina de 20 g que contiene el ingrediente activo anticoagulante Brodifacoum, activo con una sola ingestión, efectivo contra ratón común (*Mus musculus*) y rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), en todas las etapas del desarrollo. La formulación consiste en un atractivo bloque de parafina para las especies de roedores indicadas anteriormente.

Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia. El cebo en bloque contiene sustancias dulces e ingredientes de origen alimentario, que lo hacen atractivo por las especies de roedores mencionadas anteriormente.

La consistencia del bloque es atractiva debido a la aptitud natural de los roedores para roer, y el contenido de parafina hace el cebo particularmente resistente y adecuado para su uso en ambientes húmedos.

El producto tiene un agujero en el medio que permite colgarlo de manera estable a los pasadores dentro de los portacebos.

MASSOBLOCK 25 incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de Denatonio) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

MASSOBLOCK 25 se puede utilizar en interior y alrededor de edificios en áreas de las industrias de alimentos, almacenes, hoteles, restaurantes, bares, oficinas etc. Su uso también está indicado dentro de las plantas de suministro eléctrico.

MASSOBLOCK 25 es un cebo bloque listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación, debidamente etiquetados, protegidos de los agentes atmosféricos, la ingestión de especies no objetivo y la dispersión en el medio ambiente

El Brodifacoum es un rodenticida anticoagulante de segunda generación derivado de la cumarina, siendo el más activo que se conoce. Reduce la capacidad de coagulación de la sangre (factores II, VII, IX y X) por inhibición de la protrombina y bloqueo de la reductasa en el ciclo de la vitamina K1-epóxido. Controla eficazmente ratas y ratones, incluyendo a los roedores resistentes a los anticoagulantes de primera generación (warfarina y cumatetralilo).

MODO DE EMPLEO

Antes de utilizar el producto es necesario inspeccionar detenidamente la zona de infestación para localizar indicios de la presencia de roedores.

Una vez determinados los lugares donde se situará el cebo, éste se colocará protegido en portacebos para evitar que lo encuentren otros animales y facilitar que lo ingiera el roedor.

Es recomendable no tocar el cebo con las manos para evitar que ratas o ratones desconfíen al percibir su olor (utilizar guantes en la manipulación del producto).

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 – 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

Se deberá reponer los cebos consumidos o deteriorados diariamente, durante al menos 10-15 días consecutivos. Los emplazamientos deben mantenerse llenos de cebo hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, que se observará porque el cebo permanece intacto.

Una vez realizado el tratamiento inicial y se haya conseguido eliminar la población de roedores, es conveniente mantener cebados algunos portacebos en una serie de emplazamientos y revisarlos una vez por semana para prevenir una reinvasión.

DOSIFICACIÓN

Mus musculus (ratón común). Adultos y jóvenes

* Interior

* Personal profesional: 20-40 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros

* Personal profesional especializado: 20-40 gramos de cebo por portacebo.

* Alrededor de edificaciones

* Personal profesional especializado: 20-40 gramos de cebo por portacebo.

Rattus norvegicus (rata parda o de alcantarilla).

* Interior

* Personal profesional: 100-200 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros

* Personal profesional especializado: 100-200 gramos de cebo por portacebo.

* Alrededor de edificaciones

* Personal profesional: 100-200 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros

* Personal profesional especializado: 100-200 gramos de cebo por portacebo